

Imiquimod crème is een crème die uw eigen afweer activeert. Het wordt gebruikt voor verschillende huidaandoeningen. De gebruiksinformatie in deze folder gaat over gebruik in het anogenitale gebied, dus de vulva, anus en penis.

■ Imiquimod creme

Imiquimod crème activeert uw eigen afweer. Dit helpt bij het genezen van bepaalde huidaandoeningen die veroorzaakt worden door het Humaan Papillomavirus (HPV). Ook sommige vormen van huidkanker reageren goed op imiquimod crème.

We schrijven imiquimod creme voor bij de volgende huidaandoeningen:

- Genitale wratten (condylomata acuminata)
- Vulvaire HSIL (high grade intraepithelial neoplasia), een voorstadium van vulvakanker
- PeIN (peniele intraepitheliale neoplasie), een voorstadium van peniskanker
- AIN (anale intraepitheliale neoplasie), een voorstadium van anus kanker
- Actinische keratose, een voorstadium van huidkanker
- Oppervlakkige vormen van huidkanker (superficieel basaalcelcarcinoom)

Soms wordt de crème voorgeschreven als aanvulling op een andere behandeling, bijvoorbeeld een laserbehandeling.

■ Het gebruik

Tijdens het spreekuur krijgt u uitleg over hoe en waar u de crème gebruikt. U kunt de crème zelf smeren, of uw partner of iemand anders smeert de crème voor u.

In het kort gebruikt u de crème als volgt:

- Doe de juiste hoeveelheid crème op uw vinger en smeer het op de huidafwijking. Smeer de crème tot 1 centimeter rondom de plek. Uw arts informeert u over het te smeren gebied.
- U smeert de crème meestal op 3 avonden per week. Doe dit bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag, of op dinsdag, donderdag en zaterdag.
- Was uw handen na afloop goed, zodat er geen crème op uw handen achterblijft.
- Vermijd seksueel contact op de dagen dat u crème smeert.
- Om de crème goed zijn werk te laten doen, laat u de crème ongeveer 8 uur op de huid zitten. Daarna reinigt u de huid met water en kunt u uw eigen vette zalf (bijvoorbeeld paraffine vaseline zalf) weer gaan gebruiken.

■ Duur van de behandeling

De duur van de behandeling verschilt per huidaandoening. Voor vulvaire HSIL, PeIN en AIN gebruikt U de crème meestal 16 weken. Als u de crème 4 weken hebt gebruikt, evalueren we telefonisch met u hoe het gaat.

■ Bijwerkingen en complicaties

Als u de crème gebruikt, ontstaat er een oppervlakkige wond. Deze wond is vergelijkbaar met een schaafwond. Sommige mensen krijgen last van jeuk, branderigheid of pijn rond het behandelde gebied. Heel soms hebben mensen last van wat bloedverlies. Als u heftige jeuk of pijn heeft, adviseren we u om de crème 1 of 2 dagen niet te gebruiken. Soms moet u de crème een hele week niet gebruiken.

Sommige mensen krijgen last van griepachtige verschijnselen, zoals koorts, niet lekker voelen of heftige maag-darmklachten. Om deze bijwerkingen te verminderen, kunnen soms aanvullende medicijnen of crèmes geadviseerd worden.

Soms krijgen mensen last van stemmingswisselingen of sombere gedachten en gevoelens. Als u hier last van heeft, adviseren we u om de behandeling (tijdelijk) te stoppen.

Neem contact op met uw arts, voordat u stopt met de behandeling.

■ Wat kunt u zelf doen?

Als u pijn heeft of griepachtige verschijnselen heeft, adviseren we u om paracetamol in te nemen. Neem 3 keer per dag 2 tabletten van 500 mg, totdat u geen klachten meer heeft. U kunt ook ibuprofen gebruiken. Neem 1 tot 3 keer per dag 400 mg. Bij de meeste patiënten zijn deze verschijnselen tijdelijk, bijvoorbeeld steeds de dag na het smeren.

Samenwerkingsverband Anogenitaal Netwerk

In het Anogenitaal Netwerk werken dokters uit verschillende ziekenhuizen en van meerdere medische specialismen met elkaar en met andere zorgverleners samen rondom de zorg aan patiënten met anogenitale klachten. In het Anogenitaal Netwerk delen dokters hun kennis en expertise rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk

Imiquimod creme



onderzoek met elkaar. Ons doel: de beste zorg, op het beste tijdstip en op de beste plek.